

Contributions to the knowledge of the Fauna of the Canary-Islands, edited by Dr. D. L. Uyttenboogaart XX

Zwei neue Carabiden der canarischen Insel Lanzarote, beschrieben

von

B. H. KLYNSTRA

Dyschirius Uyttenboogaarti nov. sp.

Clypeus ohne Mittelzahn, dreieckig erhaben, hinten spitzwinkelig begrenzt und in ein deutliches Stirnkielchen ausgezogen. Halsschildseiten vollständig gerandet.

Flügeldecken in der Verlängerung des Nahtstreifens mit basalem Porengrübchen; am Seitenrande, hinter den Schultern, mit drei Borstengrübchen und im dritten Zwischenraum mit drei deutlichen Dorsalpunkten. Flügeldecken ohne Basalhöckerchen und mit zwei Praeapikalpunkten. Die Seitenrandung der zylindrischen Flügeldecken setzt sich auf die Basalfläche nicht fort.

Die zwei ersten Glieder der Fühler und die Hälfte des dritten rot, die andern Glieder dunkel, fast schwarz.

Enddorn und Endsporn der Vorderschienen gleich stark entwickelt. Das unterste Zähnnchen am Aussenrande der Vorderschienen schärfer, grösser und spitziger als das Mittlere.

Dem *D. aeneus* (Dej.) Wagn. nahe verwandt; von demselben durch Folgendes verschieden. Die Stirne ganz glatt, ohne Querfalten. Stirnkielchen mehr erhaben und mehr spitzig ausgezogen. Halsschild kürzer und gewölbter, fast kugelförmig, ganz glatt ohne Falten. Flügeldecken kürzer und breiter, infolge feiner, mikroskopischer Chagrinierung etwas matt; Streifen gröber punktiert. Beine heller, rotbraun. Etwas kleiner. Länge 2,8 mm. Fundort Insel Lanzarote.

Die einzige Type befindet sich in der Sammlung des Herrn Dr. D. L. Uyttenboogaart.

Stenolophus lanzarotensis nov. sp.

Endglied der Kiefertaster gegen die Spitze mässig verengt, an der Spitze deutlich abgestutzt.

Halsschild gelbbrot, ausgenommen die Vorseite; nach hinten

verengt, nur an den Seiten gerandet. Hinterecken des Halsschildes stumpfwinkelig, wenig abgerundet.

Die drei ersten Glieder der bräunlichen Fühler, die Taster und Beine rotgelb.

Dem *St. discophorus* Fisch. nahe stehend; durch folgende Merkmale verschieden. Halsschild breiter als lang, Basaleindrücke desselben weniger deutlich angegeben, flacher, viel dichter und mehr ausgedehnt punktiert. Unterseite gelbrot; Abdomen teilweise schwärzlich rot. Oberseite des Kopfes und Vorseite des Halsschildes schwarz. Rest des Halsschildes rot. Flügeldecken breiter, flacher, weniger gestreckt und weniger gewölbt; gelbrot mit bläulichem Schimmer, ohne Fleck.

Länge 7,5 mm. Fundort Puerto Arrecife, Lanzarote.

Die einzige Type, ein ♀, befindet sich in der Sammlung des Herrn Dr. D. L. Uyttenboogaart.
